

Programma fertilizzazione AGLIO E CIPOLLA

STADIO	FBSM NANOROCK	BIODRIP SIMPLEX	BIOF L VIGOR	FBSM VERDURE	BIOF L S	BIODRIP DRY	BIODRIP STIM	BIOCARE LIV T	BIOGRAIN Z
Pre trapianto/ trapianto	200								
Post trapianto						15	15	0.15	
4-6 foglie vere				2	5				1
Formazione bulbilli		15	5	2	5	15			1
Inizio maturazione		15		2					1

NOTE:

Le dosi riportate in tabella sono espresse in Kg/ha.

Tutti i prodotti utilizzati sono ammessi in agricoltura biologica.

Al fine di limitare la comparsa delle malattie fungine che interessano la parte apicale si consiglia l'applicazione di Verdure e Biograin Z ad intervalli di 15-20 giorni, in caso di varietà particolarmente sensibili o zone suscettibili si consiglia l'applicazione preventiva di Probi al posto di Verdure con le medesime dosi.

I metaboliti presenti nei nostri prodotti proteggono e fortificano la coltura, rendendola meno suscettibili a marciumi radicali e/o dei bulbi.

In presenza di afidi o di peronospora si consiglia l'applicazione di Biofoliar L Tiny.

